カゴ罠

ネズミの集落一斉防除

期	間	9月29日(月)~10月3日(金)/
場	所	元地地区、静沢地区 //
体	制	実施:小笠原村(受託事業者:フローラ) 協力:小笠原自然保護官事務所、小笠原諸島森林生態系保全センタ 小笠原支庁、その他関係機関・団体等
方	法	・用地内にネズミ捕獲器(カゴわな)を設置 ・エサは魚肉ソーセージとゴマ油を使用 ・初日の午後にカゴわなを設置し、毎朝点検を実施

【周辺の皆様へのお願い】

- 近接する住宅や事業所等においても同様の取組を 一斉に行うことで、防除の効果が高まることが 期待されます。
- ・被害を防ぐためには自主防衛が重要であるため、 母島支所にて、「カゴわな」の無料貸し出しを行っています。 ご協力を頂ける方は、問合せ先にご連絡ください。
- ※エサの準備、カゴわなの点検、捕獲ネズミの処理は各自で行っていただきます。
- ・<u>処分が困難な方は、問合せ先にご連絡ください。この期間に限り、</u> 村役場(母島支所)が代わって処分いたします。
- カゴわなに、お子様やペットが誤って接触することのないようご注意ください。
- ・万一、野鳥等の混獲を目にされた場合には、問合せ先にご連絡ください。

BSによる防除試行

・今回、一部の行政機関と関係団体の施設において、 殺鼠剤を充填したベイトステーション(BS)設置に よる防除を試行します。

期間 10月1日(水)~31日(金)

使用殺鼠剤:ヤソジオン(粒剤)

有効成分はダイファシノン (濃度 0.005%)、残りの成分はほとんど 穀物で、ネズミでも複数回食べないと致死しない程度の毒性

・期間中はBS周辺にネズミの死亡個体が多く出る可能 性があるため、概ね毎日点検を行い、死亡個体は回収 する予定です。



息父

10月6日(月)

~10 日(金)



BSによるネズミ防除に ご協力いただける皆さまへ

殺鼠剤を使ったネズミ駆除を行う場合、今回使用する殺鼠剤は穀物が主成分のため、穀物を好むアカガシラカラスバトやオガサワラカワラヒワが誤って食べてしまう恐れがあります。そのため、殺鼠剤をベイトステーション(BS)に入れて使用することで、野鳥をはじめとした在来生物にとっても安全な方法でネズミ対策が可能です。

BSの使用方法

- ・母島支所からの配布物:BS、殺鼠剤、注意案内ラミネート、BS 用の鍵、本紙(2枚目が点検シート)
- ・点検シートに防除前の印象を記入。BSにラミネートを張り付け
- ·BSに殺鼠剤を充填(BS内は2つの部屋に分かれており、殺鼠剤をすり切りで充填すると 200g/部屋、2部屋で約 400g。)
- ·10~20m程度の間隔で設置(カゴわなの半分数が目安)
- ・10月1日(水)に設置し、31日(金)にBSを撤収(昨年度の試行をふまえ、期間を 1 ヶ月に延長。 一斉防除期間中に殺鼠剤の補充はしない。)
- ・設置した箇所周辺(道路含む)を概ね毎朝点検し、ネズミの死体が確認された場合は個体数をカウント、点検シートに回収日と数を記入し、死体を回収・処分(埋設、コンポスト化)
 - →死体は防除実施者それぞれで処理することが基本だが、困難な場合は、一斉防除期間に限って 役場に持ち込みも可能

※終了する場合

- →BS 内の殺鼠剤の残量や状況を確認し、点検シートに記入 (記入例:3 割程度減った。ゴキブリ、アフリカマイマイがいた。 など)
- →殺鼠剤を処分し、BS のラミネートを剥がし、洗浄・乾燥して、点検シート、鍵とともに支所に返却
- ※継続して設置する場合 殺鼠剤等ご相談ください
 - →設置した箇所周辺(道路含む)の点検は、**集落であることから概ね毎朝点検**し、ネズミの死体が 確認された場合は回収・処分すること
 - →1ヶ月程度ごとにBS内を点検し、殺鼠剤(粒剤)を補充すること
 - →殺鼠剤の充填量は消費量に応じて 200~400g

BSの効用

- ・風雨による殺鼠剤の劣化抑制
- ・殺鼠剤の子供やペットによる誤食や野生動物による摂食の防止

ダイファシノン

- ・使用する殺鼠剤ヤソジオンの有効成分はダイファシノン(濃度 0.005%)、残りの成分はほとんど 穀物で、ネズミでも複数回食べないと致死しない程度の毒性
- ・第1世代抗凝血性剤(血を固まりにくくする薬剤。血液をサラサラにする治療に使われることもある。)
- ・小笠原の無人島でのネズミ駆除における使用実績があり、他の生き物への影響の検証がされている

点検シート 下表に記入後、母島支所に提出してください。

実施団体名:					BS設置数:	基	
回収日							
回収数							
備考							
回収日							
回収数							
備考							
防除前の印象	(ネズミの)目撃頻度、被害	等)	防除	後の印象(殺鼠)	剤の減り具合含む	